

## แนวทางการปฏิบัติการคัดกรอง ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก (อายุน้อยกว่า 14 ปี)

พยาบาลประเมินให้การช่วยเหลือตาม ABCD ส่งห้อง ER ทันที

### 1. มีประวัติ อาการที่ต้องได้รับการประเมินและช่วยเหลือเร่งด่วน

- 1) หายใจผิดปกติ หายใจเร็วตื่น หายใจเสียงดัง
- 2) สีมัว เล็บเขียว
- 3) ง่วงซึม กระตุ่นไม่ค่อยตอบสนอง
- 4) มีอาการชัก
- 5) บาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก (Burn) ตั้งแต่ 10% ขึ้นไป (อ้างอิงรูปประเมินแผลไฟไหม้ด้านล่าง)

### 2. สัญญาณชีพผิดปกติ

#### 1) BP

- i. อายุ 1-10 ปี;  $< 70 + \text{อายุ(ปี)} * 2$
- ii. อายุมากกว่า 10 ปี;  $< 90/60$

#### 2) Pulse

- i. อายุน้อยกว่า 3 เดือน;  $< 80$  หรือ  $> 180$
- ii. อายุ 3 เดือน ถึง 3 ปี;  $< 60$  หรือ  $> 160$
- iii. อายุมากกว่า 3 ปี ไม่ถึง 8 ปี;  $> 140$
- iv. อายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป;  $> 100$


#### 3) RR

- i. อายุน้อยกว่า 3 เดือน;  $> 50$
- ii. อายุ 3 เดือน ถึง 3 ปี;  $> 40$
- iii. อายุมากกว่า 3 ปี ไม่ถึง 8 ปี;  $> 30$
- iv. อายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป;  $> 20$


#### 4) Temp -> Temp $> 38.5$ C

- i. อาการคงที่ (Stable) เช็ดตัวลดไข้ส่งพบแพทย์
- ii. อาการไม่คงที่ (Unstable) ส่งตรวจรักษาที่ ER

ประเมินบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก



แนวทางการปฏิบัติการคัดกรอง ดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 14 ปี ขึ้นไป)



- ① ประเมินผู้ป่วยที่ต้องให้การรักษาเร่งด่วน
- นอนมา เรียกไม่ตอบ ปลุกไม่ตื่น
  - มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หรือจุกแน่นลิ้นปี่
  - มีอาการอ่อนแรง/ปากเขียว/พูดไม่ชัด
  - มีอาการไข้ ร่วมกับ หายใจเหนื่อย

- ② ประเมินโรคที่ต้องแยกโซนตรวจ
- มีอาการไอเรื้อรังตั้งแต่ 2 สัปดาห์
  - มีไข้ ผื่น

- ③ ผู้ป่วยวิกฤต
- มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หรือจุกแน่นลิ้นปี่
    - มีโรคประจำตัวเบาหวาน โรคหัวใจ
    - มีอาการไม่คง\*\*
  - มีอาการอ่อนแรง/ปากเขียว/พูดไม่ชัด
  - มีอาการไข้ ร่วมกับ หายใจเหนื่อย
    - เป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง\*\*\*
  - มีอาการชัก
  - มีประวัติชัก ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
    - เด็กอายุ ≤ 1 ปี
    - โรคลมชัก
  - ผู้ป่วยอุบัติเหตุไม่เกิน 24 ชั่วโมง
  - ผู้ป่วยสงสัยน้ำตาลผิดปกติ แล้วพบ Dtx >400 mg% หรือ <70mg%

- ④ สัญญาณชีพผิดปกติ
- Pulse ≤ 50, ≥ 120
  - RR ≥ 30
  - BP < 90/60
  - SaO2 < 92%

- 📌 ป้ายเตือน\*
- อาการตามข้อ 1
  - ความดันโลหิตตัวบนมากกว่า 160
  - ชีพจรเร็วกว่า 100
  - \*\*\*วัดซ้ำ 2 ครั้งหลังนั่งพักมากกว่า 15 นาที\*\*\*

- 📌 อาการไม่คงที่\*\*
- ความดันโลหิตต่ำ
  - ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง
  - มีภาวะช็อก
  - มีอาการแน่นหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด
  - มีภาวะหัวใจล้มเหลว

- 📌 ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง \*\*\*
- มีโรคประจำตัว DM, COPD, CKD stage IV/V, Cirrhosis, CA on CMT, AIDS
  - อายุมากกว่า 60 ปี

จัดโซนผู้ป่วยที่ต้องติดตามใกล้ชิด เช่น ผู้ที่วัด VS ซ้ำ, ผู้ป่วยที่พ่นยา

ประเมินผู้ป่วยอีกครั้ง ผู้ป่วยที่ Admit ทุกรายทำ V/S ก่อนadmit

\*\*\*ประเมินว่ามีความเสี่ยงแต่ไม่เข้าเกณฑ์ส่ง ER ทันที **บันทึกความเสี่ยง** และนำข้อมูลมาทบทวนทุกสิ้นเดือน\*\*\*