

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพผิดปกติ

1. $BP \geq 140/90$ mmHg ให้นั่งพัก ๑๕ นาที แล้ววัดซ้ำด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ manual
 - $BP \geq 160/100$ mmHg รถนั่ง ส่งพบแพทย์ OPD
 - $BP \geq 180/100$ mmHg รถนั่ง ส่งER

2. $BP < 100/60$ mmHg (วัดด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital) ให้วัดซ้ำด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ manual ทันที
 - $BP \leq 90/60$ mmHg, $P > 100$ bpm มีอาการผิดปกติ On O2 ส่งER โดยรถนอนตาม clinical ของผู้ป่วย
 - $BP \leq 90/60$ mmHg, Pulse ปกติ อาการผิดปกติไม่ชัดเจน ให้ให้วัดซ้ำด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ manual ทุก ๕ นาที X ๒ ครั้ง ถ้ายัง $BP \leq 90/60$ mmHg On O2 ส่งER โดยรถนอนตาม clinical ของผู้ป่วย

3. - $P \leq 60$ bpm ไม่มี clinical รถนั่ง ทางด่วนส่งพบแพทย์ OPD
 - $P \leq 60$ bpm Irregular รถนั่งส่งทำ EKG ทางด่วนส่งพบแพทย์ OPD

4. - $P \leq 50$ bpm ไม่มี clinical รถนั่งส่งทำ EKG ทางด่วนส่งพบแพทย์ OPD
 - $P \leq 50$ bpm Irregular / มีอาการหน้ามืด วิงเวียน On O2 ส่ง ER ทันที โดยรถนอนตาม clinical ของผู้ป่วย

5. - $P \geq 120$ bpm ไม่มี clinical รถนั่งส่งทำ EKG ทางด่วนส่งพบแพทย์ OPD
 - $P \geq 120$ bpm Irregular / มีอาการใจสั่นร่วมด้วย ส่ง ER ทันที โดยรถนั่งหรือรถนอนตาม clinical ของผู้ป่วย

6. ในผู้ใหญ่ $RR \geq 30$ bpm ร่วมกับหายใจเหนื่อยหอบ O2 ส่ง ER ทันที โดยรถนอนตาม clinical ของผู้ป่วย